

# Fauna autóctona para conocer y cuidar



*Chroicocephalus cirrocephalus*

## Gaviota capucho gris

**Otros nombres:** Grey-headed Gull (inglés), gaiivota-de-cabeça-cinza (portugués).

**Identificación:** Mide alrededor de 40 cm de longitud. Las patas y el pico son rojos. En época reproductiva presenta cabeza y garganta grises. El cuello, cola, rabadilla y zona ventral, blancos. Zona dorsal y cubiertas alares, grises. En época no reproductiva pierde la capucha gris. Tiene iris claro a diferencia de la gaviota capucho café (*Chroicocephalus maculipennis*).

En vuelo se observa mancha

blanca que contrasta con punta negra de las alas.

**Distribución:** Brasil, Paraguay, Argentina, islas Falkland, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. En algunos países de África se puede encontrar una subespecie denominada *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus*.

**Hábitat:** Zonas costeras y humedales interiores.

**Comportamiento:** Solitaria, en pareja o formando pequeños grupos. Su dieta incluye invertebrados, peces, huevos de otras aves y carroña.

**Reproducción:** Nidifica en

primavera. En nuestro país forma colonias en los ríos interiores. El nido consta de una sencilla plataforma de palitos y pastos. Pone alrededor de 3 huevos ocre verdosos con manchas oscuras.

**Situación poblacional:** Preocupación Menor (LC) a nivel global y local.

**Curiosidades:** Esta gaviota está presente en varios departamentos del país, Paysandú es uno de ellos. A veces se acerca a

basurales en busca de alimento y también suele seguir al arado para consumir insectos que quedan expuestos.

**Dónde la puedo ver:** Termas del Daymán, meseta de Artigas, San Javier, PN Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, represa Baygorria, San Gregorio de Polanco, etc. Puede estar presente en cualquier punto de las costas del río Uruguay, Río de la Plata, río Negro y en la



**COENDU no tiene vinculación la publicidad de esta página**

costa atlántica. También hay registros en Rivera, Cerro Largo, Durazno y Lavalleja.

Verónica Arburúas



Gustavo Casás



Gustavo Fernández Pin



## Pato brasilero

*Amazonetta brasiliensis*

**Otros nombres:** Brazilian Teal (inglés); pato aliverde, pato curirí o pato de ala verde en distintos países de América.

**Identificación:** Pato pequeño, 36 cm de longitud. En vuelo presenta un llamativo espejo alar verde azulado. En esta especie existe dimorfismo sexual: el macho es pardo acanelado, con coloración blanca a ambos lados del cuello. El pico y las patas son rojos.

La hembra tiene pico color plomizo y patas rojas. Posee una mancha blanca en la base del pico y otra más pequeña delante del ojo.

**Distribución:** Está presente en Colombia, Venezuela, Gu-

yana, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina y Uruguay.

**Hábitat:** Arrozales, bañados, esteros y lagunas.

**Comportamiento:** Se lo ve en pareja, a veces en pequeños grupos. Se alimenta en la superficie del agua, prefiere lugares con mucha gramínea. Consume plantas acuáticas, semillas e invertebrados acuáticos. Ave agresiva con otros patos, los machos se enfrentan por territorio.

**Reproducción:** Nidifica durante todo el año, en lugares lejos del agua. Puede llegar a poner hasta 15 huevos y la incubación dura 25 días. Tanto el macho como la hembra cuidan a los pichones.


**Situación poblacional:** Preocupación Menor a nivel global y local (LC - UICN). Es un residente abundante en nuestro país.

**Curiosidades:** Es muy arisco, ante la menor amenaza vuela bajo y emite un fuerte silbido. Por lo general


la hembra vuela delante del macho.

**Dónde lo puedo ver:** Lo podemos ver en cualquier espejo de agua del país. De día es común encontrarlo en los bordes de tajamares y lagunas. Hay registros en Termas de Daymán y Meseta de Arigas.

Verónica Arburúas



Hembra



Tinambú Ecologías



Verónica Arburúas